

## Uw voorbereiding op een CT-scan

U ontvangt deze informatie, omdat u binnenkort een CT-scan bij ons krijgt. In deze informatie kunt u lezen hoe u zich hierop moet voorbereiden.

### De voorbereiding op een CT-scan

Een CT van hoofd, hals, longen of aorta

Wij verzoeken u twee uur voor het onderzoek nuchter te blijven in verband met het (eventueel) inspuiten van contrastvloeistof in een ader van uw arm. Medicijnen mag u gewoon innemen, eventueel met een beetje water.

### Een CT-IVP

Wij verzoeken u twee uur voor het onderzoek nuchter te blijven in verband met het inspuiten van contrastvloeistof in een ader van uw arm. Medicijnen mag u gewoon innemen, eventueel met een beetje water. Vlak voor het onderzoek, op de afdeling radiologie, krijgt u 400 cc water te drinken.

### Een CT van wervels, botten of bijholten

Geen speciale voorbereiding nodig.

### Een CT-enteroclyse (CT-Sellink)

Wij verzoeken u twee uur voor het onderzoek nuchter te blijven in verband met het inspuiten van contrastvloeistof in een ader van uw arm. U moet vijf kwartier voor de aanvang van het onderzoek aanwezig zijn om 1,5 liter vloeistof te drinken om de darmen te vullen.

### Een CT-punctie/-biopsie of drainage

Soms is het nodig om met behulp van de CT-scan wat weefsel weg te halen voor onderzoek. Uw arts vraagt ons dan om een CT-geleide punctie of biopsie uit te voeren. Voor deze behandeling zult u via de dagbehandeling opgenomen zijn in ons ziekenhuis. Wij verdoven plaatselijk de punctieplaats. Na de ingreep moet u nog twee uur in bed blijven om er zeker van te zijn dat het gebied waarin geprikt is weer voldoende hersteld is. Voor dit onderzoek is meestal geen voorbereiding nodig.

### Een CT van de organen in de buik

Wanneer wij een CT-scan van de organen in uw buik maken, krijgt u tijdens het onderzoek contrastvloeistof ingespoten via een ader van uw arm. De dag voor het onderzoek moet u beginnen met het drinken van een verdunde contrastvloeistof. Het flesje met contrastvloeistof Telebrix Gastro krijgt u van tevoren bij de balie van de afdeling radiologie. Dit flesje moet u met 1 liter water vermengen en drinken, eventueel met wat limonadesiroop voor de smaak.

Houdt u zich bij het drinken aan de volgende voorschriften:

- Als het onderzoek 's morgens plaatsvindt, drinkt u de dag daarvoor de contrastvloeistof:
  - om 9.00 uur 200 cc;
  - om 13.00 uur 200 cc;
  - om 21.00 uur 200 cc.
- U houdt 400 cc over voor de volgende dag.
- Als het onderzoek 's middags plaatsvindt, drinkt u de dag daarvoor:
  - om 13.00 uur 200cc;
  - om 21.00 uur 200 cc;
  - en op de dag van het onderzoek om 9.00 uur 200cc.
- Op de dag van de CT-scan moet u twee uur voor het onderzoek nuchter blijven. Voor die tijd mag u een licht ontbijt gebruiken. De resterende 400 cc contrastvloeistof drinkt u 1,5 uur voor het onderzoek op.
- Medicijnen mag u gewoon innemen, eventueel met een beetje water.

Vlak voor het onderzoek krijgt u op de afdeling radiologie nog wat contrastvloeistof te drinken. Meldt u zich daarom een kwartier voor de afgesproken tijd.